

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  
TỈNH TUYỀN QUANG  
**CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ  
BẢO VỆ THỰC VẬT**

Số: 65/TTBVTV-BVTV  
V/v Chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn cổ  
bông hại lúa xuân năm 2018.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 27 tháng 4 năm 2018

Kính gửi: Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các huyện, thành phố

Hiện nay trên lúa xuân, giai đoạn làm đòng đến trổ bông; bệnh đạo ôn lá đã phát sinh gây hại; tỷ lệ lá bị hại phổ biến 3 đến 5 % số lá, nơi cao 15 đến 20 % số lá, điểm cục bộ 30 đến 40 % số lá, hại trên các giống nhiễm như BC15, TBR225, Nếp, Thiên ưu 8, .... Tổng diện tích bị nhiễm bệnh là 185,3 ha, trong đó nhiễm nặng 17,9 ha (Hàm Yên, Chiêm Hóa, Lâm Bình, Na Hang, ...).

Dự báo trong thời gian tới, thời tiết tiếp tục có các đợt không khí lạnh yếu, có mưa, trời âm u, ẩm độ không khí cao là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn cổ bông gây hại trên lúa giai đoạn trổ bông đến chín;

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật yêu cầu Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn kiểm tra, theo dõi sát diễn biến bệnh đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông; đôn đốc, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời; không để bệnh lây lan ra diện rộng.

2. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hướng dẫn các biện pháp phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông như sau:

- Đối với ruộng đã bị đạo ôn lá cần tiến hành phun phòng bệnh 2 lần, trước trổ và sau khi trổ bông từ 5 đến 7 ngày.

- Đối với những ruộng sử dụng các giống nhiễm bệnh (BC15, TBR 225 Nếp, Thiên ưu 8,...), những ruộng vụ trước, năm trước đã bị bệnh, ruộng bón thừa phân đạm,... thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, nếu bệnh xuất hiện cần tiến hành phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông.

Sử dụng các thuốc phòng trừ bệnh đạo ôn đã được đăng ký trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ thuốc: Trizole 20WP, Filia 525SE, Ninja 35EC, Katana 20SC...) nếu ruộng bị bệnh nặng phải phun kép 2 lần, cách nhau từ 5 đến 7 ngày. Nồng độ và liều lượng theo hướng dẫn sử dụng trên bao bì;

3. Trong thời gian tới cần chú ý phòng trừ một số đối tượng như: rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, bệnh khô vằn, chuột,...

Yêu cầu các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo tại văn bản này./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (thực hiện);
- Sở NN và PTNT (Báo cáo);
- Lãnh đạo Chi cục;
- TT khuyến nông;
- Phòng NN và PTNT các huyện;
- Phòng Kinh tế Thành phố ;
- Trạm Khuyến nông các huyện, TP;
- Lưu: VT, KT.

(Phối hợp);

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**



**Trần Thị Lịch**