

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TỈNH TUYỀN QUANG
**CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ
BẢO VỆ THỰC VẬT**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 76 /TT BVTV- BVTV
V/v phòng trừ bệnh bạc lá và đốm sọc vi
khuẩn hại lúa xuân năm 2018

Tuyên Quang, ngày 11 tháng 5 năm 2018

Kính gửi: Trạm Bảo vệ thực vật các huyện thành phố

Hiện nay trên lúa xuân đang ở giai đoạn làm đòng đến trỗ bông - chín sữa cây sinh trưởng phát triển tốt. Đêm ngày 08/5/2018 tại một số huyện, thành phố trong tỉnh đã có mưa rào và giông kèm theo mưa đá, đây là điều kiện thuận lợi để bệnh bạc lá và đốm sọc vi khuẩn phát sinh phát triển và gây hại, ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây lúa, làm giảm năng suất lúa xuân.

Để chủ động phòng ngừa hạn chế thấp nhất thiệt hại do bệnh bạc lá và đốm sọc vi khuẩn gây ra Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật yêu cầu các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn kiểm tra, theo dõi diễn biến bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn và các đối tượng dịch hại khác, đôn đốc tuyên truyền, hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời. Đặc biệt những nơi đã bị bệnh, những vùng lộng gió, năm trước, vụ trước đã xuất hiện bệnh, tổ chức chỉ đạo nông dân phun trừ ngay không để bệnh lây lan ra diện rộng.

2. Biện pháp phòng trừ bệnh bạc lá và đốm sọc vi khuẩn như sau:

Thường xuyên thăm đồng, theo dõi, phát hiện bệnh sớm; chăm sóc, điều tiết nước hợp lý để cây lúa sinh trưởng, phát triển khỏe; bón phân cân đối N-P-K và phân chuồng; không bón quá nhiều đạm, bón đạm muộn và kéo dài;

Khi phát hiện ruộng bị bệnh yêu cầu ngừng bón phân hóa học, các chất kích thích sinh trưởng, phân bón qua lá; giữ mức nước trên ruộng ổn định từ 2-3 cm; sử dụng một trong các loại thuốc sau để trừ bệnh đốm sọc vi khuẩn: Sasa 20 WP, Avalon 8WP, Sasumi 70 WP, An-ti-xo 200 WP ... và các thuốc khác có cùng hoạt chất đã được đăng ký trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam.

Nồng độ và lượng nước thuốc pha theo hướng dẫn trên bao bì; những ruộng bị bệnh nặng cần phun kép 2 lần, cách nhau từ 5 đến 7 ngày; phun thuốc đảm bảo theo nguyên tắc 4 đúng.

3. Cần chú ý các đối tượng có nguy cơ phát sinh và gây hại cao như bệnh đạo ôn cổ bông, rầy nâu-rầy lưng trắng lúa 3, chuột hại, ...

Yêu cầu các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo tại văn bản này./.

Nơi nhận: *AP*

- Như kính gửi (thực hiện);
- Sở NN và PTNT (Báo cáo);
- Lãnh đạo Chi cục;
- Trung tâm khuyến nông tỉnh
- Phòng NN và PTNT các huyện
- Phòng Kinh tế Thành phố
- Trạm Khuyến nông các huyện, TP
- Báo Tuyên Quang
- Lưu: VT, BVTV.

(Phối hợp);

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**



Trần Thị Lịch