



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TỈNH TUYÊN QUANG
CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 26 tháng 4 năm 2015

Số: 103/BVTV-KT
V/v Chỉ đạo phòng trừ rầy nâu- rầy
lưng trắng hại lúa xuân năm 2015.

Kính gửi: Trạm Bảo vệ thực vật các huyện, thành phố

Theo kết quả điều tra của các Trạm Bảo vệ thực vật huyện, thành phố, hiện nay trên lúa xuân đang ở giai đoạn đứng cái-làm đòng đến trổ rải rác. Rầy nâu, rầy lưng trắng lúa 3 đã bắt đầu nở, mật độ phổ biến 500- 600 c/m², mật độ nơi cao 2.000-3.000 c/m²; điểm cục bộ 5.000 - 6.000 c/m². Dự báo trong thời gian tới: Rầy nâu, rầy lưng trắng lúa 3 sẽ tiếp tục nở và nở rộ nếu không phòng trừ kịp thời sẽ gây hiện tượng vàng lá và cháy trên diện rộng.

Thời gian phun trừ tốt nhất đối với rầy lúa 3 từ 29/4 - 05/5. Để hạn chế thấp nhất tác hại của Rầy nâu - rầy lưng trắng gây ra Chi cục Bảo vệ thực vật yêu cầu trạm Bảo vệ thực vật các huyện- thành phố:

- Tăng cường phối hợp với cán bộ khuyến nông huyện, Ủy ban nhân dân các xã kiểm tra, theo dõi diễn biến của rầy nâu - rầy lưng trắng, đôn đốc, hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời. Đặc biệt những nơi có ổ dịch phải tổ chức chỉ đạo nông dân phun trừ ngay không để dịch hại lây lan ra diện rộng.

- Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 các Trạm bố trí phân công cán bộ bám sát cơ sở hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời, theo dõi diễn biến gây hại của rầy, báo cáo thường xuyên với lãnh đạo Chi cục để có biện pháp xử lý kịp thời.

Chi cục Bảo vệ thực vật hướng dẫn một số biện pháp phòng trừ rầy nâu - rầy lưng trắng hại lúa như sau:

- Những ruộng lúa đứng cái, lá còn xanh chủ động nước và rầy tuổi nhỏ nên sử dụng một trong các loại thuốc nội hấp như: Actara 25WG, 350 FS; Actador 100 WP; Sạch rầy 200 WP; Anvado 100 WP...

- Đối với ruộng lúa từ giai đoạn trổ trở đi, sử dụng thuốc trừ rầy bằng thuốc tiếp xúc như: Sairifos 585 EC, Bassa 50 EC; Bascide 50 EC; Ecel Bassa 50 ND, Vibasa 50 ND, NIBAS 50 ND Trước khi phun thuốc phải rẽ băng rộng từ 0,8 - 1m để thuốc tiếp xúc trực tiếp với rầy ở phần gốc lúa.

- Nồng độ thuốc pha theo hướng dẫn trên bao bì và phải đảm bảo 20-25 lít nước thuốc/sào.

VP (Hàng)
Trạm TTT (Hàng)
Uly

Lưu ý: Do hiện tượng rầy gồi lúa và dịch chuyển từ trà chình vụ xuống trà muộn và việc phòng trừ hiệu quả không cao, nếu mật độ rầy trên ruộng cao trên 750 con/m² cần phải tiếp tục phòng trừ.

Yêu cầu các trạm Bảo vệ thực vật thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo tại văn bản này. /.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (thực hiện);
- Sở NN và PTNT (Báo cáo);
- Lãnh đạo Chi cục;
- TT khuyến nông
- Phòng NN và PTNT các huyện
- Phòng Kinh tế Thành phố
- Trạm Khuyến nông các huyện, Thành phố
- Lưu: VT, KT.

(Phối hợp);

CHI CỤC TRƯỞNG



Nguyễn Năm Châu